

Specifičnosti odgajivanja jednodnevnih pilića lakih hibrida

- To je odgoj koka nosilja konzumnih jaja, do pronošenja
- Iako postoje posebne preporuke za svaki hibrid, mogu se dati određeni opšti tehnološki parametri.
- Podmladak treba da dostigne telesnu masu od oko 1,25 kg u uzrastu od 17 nedelja, uz utrošak hrane od oko 5,25 kg.
- Smrtnost do uzrasta od 17 nedelja ne sme da bude 3% ili više.

Priprema objekta za naseljenje

- Najmanje tri nedelje pre naseljavanja objekta mora da se obavi izdubnavanja od prethodnog turnusa, ako i standardne operative procedure (SOP).
- SOP podrazumeva čišćenje, pranje kao i DDD program, kao proveru odnosno popravku ispravnosti opreme.
- Pet dana pre prijema pilića, mora da se obavi fumigacija objekta i sporvede test na prisustvo *Salmonelle*.

- Dva dana pre prijema, mora da se obavi dezinfekcija sistema za napajanje.
- Grejanje u veštačkim kvočkama mora da se pokrene 1-2 dana pre prijema, zavisno od lokalnih klimatskih uslova.
- Na dan pred prijem, program osveteljenja mora da se podesiti tako da simulira dan u trajanju od 22-23 sata, intenzitetom od 30 lux.

- U isto vreme pod ograničen veštačkom kvočkom mora da se obloži papirom.
- Na dan prijema, pojilice u veštačkim kvočkama treba da se napune vodom sa dodatkom elektrolita, kao i da se postave hranilice
- Ispred hranilica, na papirnu podloga poda, treba prosuti manju količinu hrane kako bi se pilići podstakli na konzumaciju.
- Papirna podloga može da se ukloni u uzrastu od 7-14 dana.

Program osvetljenja

- Prvih sedam dana intenzitet osvetljenja od 30-50 lux, a posle 15 lux.
- Sa porastom kokica sužava se odnos osvetljenog i zatmanjenog perioda u toku dana.

Uzrast, nedelja	Svetlo:Tama (fotoperiod)
1	<ul style="list-style-type: none">• 20:4• 22:2• 4:2+4:2+4:2+4:2
2-9	<ul style="list-style-type: none">• 11:13
10-19	<ul style="list-style-type: none">• 9:15• 10:10

Temperatura

Uzrast, nedelja	Temperatura, °C
1	Prva 3 dana 32-33 a posle 30-32
2	28-30
3	26-28
4	23-26
5	21-23
6-19	21

Ventilacija

- Mora da obezbedi relativnu vlažnost vazduha od 40-60%.
- Ako je prostirka vlažna, i/ili se oseća mirisa amonijaka mora se pojačati intenzitet izmene vazduha.

Uzrast, nedelja	Intenzitet ventilacije na temperaturi od 21°C, m ³ /1000 kljunova
1	170
3	255
6	510
12	1275
18	2550
19	4500

Gustina naseljenosti

Uzrast, nedelja	m²/kljun
1-8	0.0835
9-16	0.1235
17-19	0.1635

Način držanja

- Ako su mlade koke nosilje komercijalni proizvod, uobičajen je podni sistem držanja, do uzrasta od 18 nedelja, odnosno do isporuke.
- Ima i drugačijih rešenja.

Pitanja za proveru znanja

- Odgajivanje pilića lakih hibrida.