

Rase biserki

Domaća biserka (morka)

Domaća biserka (morka)

- Vodi poreklo od jedne od pet vrsta divljih biserki (*Numida meleagris*).
- Smatra se da je pripitomljena u Severnoj Africi 3000 godina p.n.e.
- Vrlo je slična divljoj.
- Dosta je netrpeljiva prema drugim vrstama živine i uvek se odvaja od drugih vrsta.
- Ima vrlo neprijatan, kreštav i prodoran glas.
- Letačke sposobnosti u odnosu na drugu živinu su bolje izražene.

- Ima malu glavu a umesto kreste jedan rožasti izraštaj u obliku šiljka, sivo-crne boje.
- Glava nije operjana.
- Kljun je srazmerno glavi, dosta dug i malo zakrivljen na vrhu.
- Podbradnjaci su mali, okrugli i crvene boje.
- Noge su srednje dužine i dosta jake, završavaju se sa četiri prsta.
- Boja perja zavisi od soja.
- Najrasprostranjenija je sivo-pepeljasta, ali može biti bela ili plava, odnosno boja lavande.
- Za sve boje karakteristična su sedefasto-bela okruglasta polja u obliku bisera, koja su pravilno raspoređena po telu.



- Polni dimorfizam je slabo izražen.
- Mužjak je nešto krupniji od ženke, oglašava se oštrije, ima veći izraštaj na glavi i veće podbradnjake.
- Telesna masa odraslih ženskih grla se kreće oko 2 kg, dok su muška grla neznatno teža oko 2,2-2,5 kg.
- Domaća biserka se odlikuje dobrim kvalitetom mesa, koje po mirisu i ukusu podseća na meso fazana.

- Domaća biserka prosečno nosi 100-150 jaja, mase 45-55 grama.
- Boja ljuske je bledo-ružičasta, sa sitnim pegama.



Pitanja za proveru znanja

Letačke sposobnosti morke:

- a) iste su kao i kod ostale živine.
- b) bolje nego kod ćuraka, a lošije nego kod kokošaka.
- c) bolje nego kod ostale živine.

Letačke sposobnosti morke:

- ~~a) iste su kao i kod ostale živine.~~
- ~~b) bolje nego kod ćuraka, a lošije nego kod kokošaka.~~
- c) bolje nego kod ostale živine.